

**Aangepast protocol MS – DMT – Corona – labcontroles – v3 (18-3-2020)**  
**Amsterdam UMC – EST - ZKE**

<b>Dimethylfumaraat (Tecfidera)</b>				
<b>Oud</b>			<b>Nieuw</b>	
<b>Lymfopenie</b>			<b>Lymfopenie</b>	<b>Controle</b>
Lymfo's $\leq 0.8$	Opnieuw bepalen na 3 maanden		Lymfo's $< 1.0$	Dosering handhaven 2dd 240 mg 3 maanden
	Indien weer laag JCV bepalen		Lymfo's $< 0.8$	Verlagen dosering naar 2dd 120 mg 3 maanden
	JCV+	Halve dosis, terug naar hele dosis indien lymfo's $> 0.8$	Lymfo's $< 0.5$	Stoppen 4 weken
		Indien lymfo's na 6 maanden niet $> 1$ ; stoppen		
		Indien lymfo's dalen of $< 0.5$ ; stoppen		
	JCV -	Lymfo $\geq 0.5$ maar $< 0.8$ ; continueren volledige dosis		
		Lymfo $< 0.5$ halveren dosis en elke 3 mnd lab tot lymfo $\geq 0.8$		
		Herhalen JCV elke 6 mnd		
		Indien 6 mnd lymfo $< 0.5$ stop medicatie		
<b>Fingolimod (Gilenya)</b>				
<b>Oud</b>			<b>Nieuw</b>	
<b>Lymfopenie</b>			<b>Lymfopenie</b>	<b>Controle</b>
Lymfo's $< 0.2$	Herhalen lab na 2 weken		Lymfo's $< 0.8$	Continueren 0.5 mg 1dd 6 maanden
	Indien nog steeds $< 0.2$ onderbreken fingo		Lymfo's $< 0.5$	Om de dag doseren 4 weken (als $> 0.8$ weer terug naar 1dd 0.5mg)
	Vervolg elke 4 weken totdat lymfo's $> 1$ (herstart indien $> 1$ )		Lymfo's $< 0.2$	Stoppen 4 weken
<b>Teriflunomide (Aubagio)</b>				
<b>Oud</b>			<b>Nieuw</b>	
<b>Lymfopenie</b>			<b>Lymfopenie</b>	<b>Controle</b>
Thans geen specifiek advies geformuleerd			Lymfo's $< 0.8$	Om de dag doseren 14mg 1dd 3 maanden
<b>Ocrelizumab (Ocrevus)</b>				
<b>Oud</b>			<b>Nieuw</b>	
<b>Lymfopenie</b>			<b>Lymfopenie</b>	<b>Controle</b>
Thans elke 6 maanden labcontrole, geen specifiek advies t.a.v. lymfopenie			B-cellen $< 10$	Gift uitstellen 4 weken
<b>Natalizumab (Tysabri)</b>				
<b>Oud</b>			<b>Nieuw</b>	
Thans elke 3 maanden labcontrole, geen specifiek advies t.a.v. lymfopenie			Geen veranderingen	